



DEVELOPPEMENT DE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

GUIDE

DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE

pour l'Agriculture Biologique à La Réunion

2024



GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION

Ce document est issu des travaux menés en Agriculture Biologique par l'ARMEFLHOR et a pour objectif d'accompagner les producteurs dans leur choix, les données de production sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions pédoclimatiques et des itinéraires techniques. Pour plus d'informations, consultez les rapports d'essais.

UTILISATION DU GUIDE

Afin d'en faciliter la lecture, les distributeurs locaux de la variété sont précisés par une abréviation après le nom de l'obteneur :

L'Agronome=La, Coroi=Co, Florhys=Fl, Hortibel=Ho,
Talarmor=Ta, TerraCoop=Te.

Les coordonnées sont à la fin du document ainsi que les abréviations des résistances aux maladies et ravageurs.

Fiche technique disponible
sur demande



ou sur le site internet :
www.armeفلhor.fr

RÉGLEMENTATION

Le cahier des charges AB interdit le recours aux semences traitées (RUE n°2018/848 modifié par le RUE 2020/1794). Les semences **non traitées (NT)** sont utilisables pour certaines variétés si indisponibles en bio après avoir fait une demande de dérogation sur :

www.semences-biologiques.org

Certains espèces sont **hors dérogation** car la disponibilité en variétés biologiques est suffisante, pour ces espèces mêmes des dérogations pour de la semence non traitée peuvent être refusées.

Si vous achetez des plants maraîchers, seuls ceux produits en AB sont acceptés.



ARMEFLHOR - 1 chemin de l'Irfa - Bassin Martin - 97410 SAINT-PIERRE

GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION

AIL (*Allium sativum* L., LILIACEE)

5 à 7 t/ha en fonction de l'itinéraire. Plantation avril-mai.

VACOA NT, FI:

variété péi de jours courts, bulbe blanc à violet, caïeux rosés. Cycle de 5 mois. Bonne conservation et adaptée à la vente en demi-sec et en sec. Qualité gustative appréciée.

(Commande en septembre-octobre)

ATTENTION : des travaux ont été menés sur l'utilisation de variétés de jours longs telles que GERMIDOUR et MESSIDOR, cependant leur culture demande d'être équipée d'une chambre froide pour initier la germination.



AUBERGINE (*Solanum melongena* L., SOLANACEE)

Bringelle ronde



BRINGELLE RONDE NT, FI:

variété péi, fruit violet de forme ovoïde de 400 g en moyenne, production régulière et rendement élevé, ne nécessite pas de taille, ni de palissage. Adaptée à un itinéraire en plein champ. Assez rustique mais sensible au Phomopsis sp. . Rendement élevé et production homogène. Le greffage sur bringelier marron (*Solanum torvum*) permet d'améliorer la tolérance au Phomopsis voire au flétrissement bactérien (*Ralstonia solanacearum*).

Shakira F1



Shakira F1



SHAKIRA F1 (GAUTIER), Co, La et Ta:

fruit de type demi-long noir brillant de très belle présentation, sans pépin et sans épine sur le calice, qualité gustative appréciée. Fruit de 350 à 400 g. Rendement élevé et production homogène.



armeflhor

ARMEFLHOR - 1 chemin de l'Irfa - Bassin Martin - 97410 SAINT-PIERRE

GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION

BETTERAVE POTAGERE (*Beta vulgaris* subsp. *Vulgaris*, CHENOPODIACEE)

ATTENTION : les semences de betterave peuvent être proposées en monogermes ou non. Habituellement les graines de betterave sont enfermées dans un glomérule (amas liégeux) qui va donner 2 à 4 plants, c'est le cas des variétés vendues au gramme (ou multigerms), un éclaircissage est souvent nécessaire. Ce n'est pas le cas des variétés monogermes vendues en Graines Calibrées (GC) : une graine donnera un plant.



ALVRO-MONO, La et Ta : production précoce. Racine ronde mais légèrement aplatie.



BOLIVAR, La et Ta : betterave relativement ronde, mais une hétérogénéité au niveau de la forme. Taille moyenne. Bonne conservation. Proche de De Détroit 2.



BORO F1 (Bejo), La et Ta : très belle présentation, bien ronde et lisse, de couleur rouge très foncé. Production et forme homogène. Le feuillage est un peu plus clair que les autres variétés et la production un peu plus tardive.



CHIOGGA, Ho, La et Ta : Racine rouge orangé avec une chair alternée de cercles concentriques rosés et blancs, mais perd sa couleur à la cuisson.



DE DETROIT 2, Ho et Ta : Racine ronde à très légèrement aplatie. Couleur rouge foncé. Production légèrement hétérogène.



NOIRE ou PLATE D'EGYPTE, Ho, La et Ta : betterave très aplatie, rouge foncé. Calibre foncé. Production très précoce. Bonne tenue au champ et sa qualité gustative est souvent soulignée.



ROBUSCHKA, Ta : forme arrondie, rouge foncé. Production homogène. Un peu moins bonne tenue au champ que les autres variétés et présence de quelques racines secondaires sur les betteraves. Amélioration de la variété De Détroit 2.

GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION

BROCOLIS (*Brassica oleracea* var. *italica*,
BRASSICACEE anciennement Crucifère)
(hors dérogation)



EN HIVER :

BELSTAR F1 (Bejo) Ho, La et Ta :

Belle présentation avec un grain fin, variété précoce (cycle de 80 j.). Haute résistance à la fusariose (Foc) et résistance intermédiaire à la rouille blanche (Ac) et à la nervation noire des crucifères (Xcc).

CHOU-ROMANESCO (*Brassica oleracea* var. *botrytis*, BRASSICACEE)

EN HIVER :

VERONICA F1 (Bejo) Ta :

Production hétérogène, assez délicat à produire, cycle de 90 à 100 jours, 500 g en moyenne. Résistance fusariose (Foc).

Variété déconseillée à La Réunion : NATALINO,
inflorescence totalement lâche.

CHOU (*Brassica oleracea* var. *capitata* L., BRASSICACEE)



ESSAI COMPLÉMENTAIRE À VENIR

FARAO F1 (Bejo) La et Ta :

Chou cabus blanc et rond de belle présentation, chou de plus d'1 kg, cycle de 95 j en hiver.



GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION

CHOU-FLEUR (*Brassica oleracea* var. *botrytis*, BRASSICACEE)

EN HIVER :



BALBOA F1 (Bejo) Ho, La et Ta

Variété précoce (90 j.), couleur blanche à crème, inflorescence dense, production groupée, en moyenne 1 kg, 15 cm de diamètre.



CLAFORSA F1 (Syngenta) NT, Co

Cycle de 95 à 110 j., couleur blanche, inflorescence dense, production échelonnée dans le temps, en moyenne 1.3 kg, 18 cm. **Résistance hernie des crucifères** (Pb).



CLAPTON F1 (Syngenta) NT, Co

Cycle de 95 à 115 j., Couleur blanche à crème, inflorescence dense, production échelonnée, en moyenne 1.1 kg, 15.6 cm. **Résistance hernie des crucifères.**

FLAMENCO F1 (Bejo) Ho, La et Ta

Cycle de 95 j., chou-fleur blanc à crème, inflorescence dense, production groupée, en moyenne 1.02 kg, 15.9 cm.



GUIDELINE F1 (Syngenta) NT, Co

Cycle de 90 à 110 j., couleur blanche à crème, belle présentation, inflorescence dense, production échelonnée (premières récoltes assez précoces), en moyenne 1.3 kg, 17.7 cm.



ODYSSEUS Ta

Variété précoce (de 80 à 90 j.), chou-fleur blanc à crème, inflorescence relativement dense mais pouvant être lâche, production échelonnée, petites têtes (410 g, 12 cm).

Le plus : semence paysanne reproductible.

EN ÉTÉ

FLAMENCO F1 (Bejo) Ho, La et Ta : cycle de 85 j., en moyenne 1 kg, 14.5 cm.

GUIDELINE F1 (Syngenta) NT, Co : cycle de 85 j., 1.25 kg en moyenne, 17 cm.

ODYSSEUS Ta : cycle de 85 j., en moyenne 0.35 kg, 10 cm.

Variétés déconseillées à La Réunion (absence de pommaison) : BALTHAZAR, MEDAILLON F1, St CASIMIR et TARDIF D'ANGER. BOULE de NEIGE à cause d'une qualité médiocre.

GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION

CONCOMBRE HOLLANDAIS *Sous abris (Cucumis sativus L., CUCURBITACEE)* (hors dérogation)



Les 3 variétés conseillées ci-dessous ont une tolérance intermédiaire au virus de la mosaïque du concombre (CMV) et au virus de jaunissement des nervures (CVYV). Elles ont également des résistances face à l'oïdium (Px : *Podosphaeria Xanthii*) et à la cladosporiose (Ccu). Leur production est d'une vingtaine de fruits par plant soit pour une densité de 1,6 plts/m² de 10 à 15kg/m² (résultats à Bassin Martin).

DREAMLINER F1 (Vitalis EZ) La et Te : production homogène, tolérance à la Cercosporiose (Cca).

LOCKHEED F1 (Vitalis EZ) La et Te : production homogène, plant vigoureux.

VERDON F1 (Rijk zwaan) Co, La et Ta : variété la plus tolérante à l'oïdium. Production homogène, tolérance à la Cercosporiose et au virus de la marbrure du concombre (CGMMV).

COURGETTE ALLONGÉE *(Cucurbita pepo L., CUCURBITACEE)* (hors dérogation)

Les 4 variétés conseillées ci-dessous ont une tolérance intermédiaire aux virus CMV, ZYMV et WMV ainsi qu'une tolérance à l'oïdium (Px). Le potentiel de production est identique pour ces variétés : entre 2.5 et 3.5 kg/m² pour une densité de 1,1 plts/m² (résultats à Bassin Martin).



PIXAR F1 (Gautier) Co : variété un peu moins vigoureuse. Fruit vert légèrement moucheté, tendance à se courber au grossissement.

ZELIA F1 (Vitalis EZ) Ta et Te : également tolérance intermédiaire au virus PRSV. Fruit vert moucheté blanc, légère forme de massue.

ZODIAC F1 (Gautier) Co, La et Ta : fruit vert droit, grossit rapidement, demande des récoltes plus fréquentes.



LINGODOR F1 (Gautier) Co, La et Ta : fruit jaune cylindrique, plant vigoureux, bon rendement et production très homogène. Les fruits donnent de la souplesse dans la récolte en ne devenant pas trop gros rapidement. Résistance aux virus avec une tolérance supplémentaire au PRSV.

GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION

HARICOT A RAMES SOUS ABRIS (*Phaseolus vulgaris* L., FABACEE) :



Les 3 variétés produisent des haricots verts sans fil de belle présentation (17-20 cm) et elles ont toutes une tolérance au virus de la mosaïque commune du haricot (BCMV). Rendement potentiel de 2 kg/m².»

COBRA **La et Ta** : gousses vertes de belle présentation, récolte homogène.

EMERITE (INRA) **Ho (en NT), La et Ta** : gousses vertes de belle présentation, récolte homogène.

VESPERAL (Gautier) **Co, La et Ta** : gousses plus vert foncé. Très belle présentation, production homogène et qualité gustative appréciée.



HARICOT NAIN (*Phaseolus vulgaris* L., FABACEE) :

PONGO (Gautier) **Co, La et Ta** :

Haricot nain, gousse vert foncé sans fil. Calibre fin (7-8 mm) et longueur de 16 cm en moyenne. Production possible sous abris ou en plein champ. Récoltes homogènes. Rendement moyen de 1 kg/m². Haute résistance à l'anthracnose (*Colletotrichum lindemuthianum*) et au virus de la mosaïque commune du haricot (BCMV).

Evaluation en cours sur CUPIDON, MAJOR (haricot beurre) et RUGALLY.



GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION

LAITUE BATAVIA (Lactuca sativa, ASTERACEE) (hors dérogation)

16 plts/m² sur la planche

DANS LES HAUTS (données 1 100 m d'alt.):



BLONDE DE PARIS Ho :
feuillage clair, pomme fermée,
dessous plat à légèrement
conique, sensible au Tip
Burn*. Feuilles extérieures
lâches, mauvaise tenue
après la récolte. Sensible au
rhizoctone. Graines nues.
Saison : été



GOTHAM (Gautier) Co et Ta :
feuillage vert frisotté, pomme ouverte, dessous plat,
moyennement sensible au Tip Burn. Récolte regroupée.
HR : Bl :16-36EU
Saison : hiver et été



CARMEN (Gautier)
Co, La et Ta :
feuilles anthocyanée
épaisses, pomme ouverte,
dessous conique, peu dense.
Peu sensible au Tip Burn.
IR: LMV: 1
Saison : été



GOLDORAC (Gautier) Co et Ta :
feuillage vert frisotté, pomme ouverte, dessous plat, cœur
dense, peu sensible au Tip Burn. Récolte étalée.
HR : Bl :16-36EU, Nr :0|IR: Fol:1
Saison : hiver et été



IMPRESSION (Rijk zwaan) Co et Ta : feuillage vert, pomme
ouverte, dessous plat, peu sensible au Tip Burn.
HR : Bl :16-32,34,36EU/Nr :0| IR: LMV:1
Saison : hiver

* : nécrose marginale (bordure des feuilles desséchées)



GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION



MAGENTA (Gautier) Co, La et Ta : feuille anthocyanée épaisse et cloquée, pomme ouverte, dessous très conique, peu sensible au Tip Burn. Récolte étalée.

HR : Bl : 16,21,23,32EU | IR : LMV : 1

Saison : hiver et été



SEMENTEL (Bejo) La et Ta :

feuillage vert clair, pomme ouverte dense, dessous conique. Peu sensible au Tip Burn.

HR : Bl : 16-37EU/Nr : 0/ TBSV

Saison : été



STORINA (Gautier) Co :

feuillage vert blond, pomme ouverte, dessous plat. Peu sensible au Tip Burn.

HR : Bl : 16,21,23,32EU | IR : LMV : 1

Saison : été



STYRIA (Vitalis) La, Ta et Te : feuillage vert foncé, pommé, dessous légèrement conique. Peu sensible au Tip Burn.

HR : Bl : 16-36EU/ Nr : 0

Saison : été

DANS LES BAS (300 m d'alt.):

En été et hiver : CARMEN, GOLDORAC, MAGENTA et STORINA

GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION

LAITUE BEURRE



ANALOTTA (Vitalis EZ) Te et Ta :

Très belle présentation, laitue blonde pommée de couleur vert clair, cœur dense, dessous plat, peu sensible au tip burn. Production homogène. Les récoltes sont assez regroupées mais bonne tenue au champ qui donne un peu plus de souplesse dans l'écoulement et bonne conservation après la coupe.

Cycle entre 44 et 47 jours. Poids moyen de 334 g (à noter que les rangs de bordures de planches dépassent les 500 g).

HR : Bl : 29-40EU/Nr : 0|IR : LMV : 1



FELICIE (Gautier) Co :

Laitue beurre pommée très anthocyanée. Belle présentation. Port des feuilles étalées. Peu sensible au tip burn. Production homogène. Récoltes étalées et bonne tenue au champ. **Cycle de 51 jours. Poids moyen de 289 g.**

HR : Bl : 29-40EU/Nr : 0|IR : LMV : 1

LAITUE ICEBERG



REINE DES GLACES ou Frisée de Beauregard (Domaine public) Co, La et Ta :

Laitue batavia de type iceberg, vert clair. Très belle présentation, pomme très dense et bordures des feuilles ciselées. Feuilles croquantes et qualité gustative à souligner. Production précoce et regroupée ne permettant pas d'attendre au champ car sensible à la montaison. La pommaison peut être hétérogène. **Cycle de 36 jours. Poids moyen de 292 g** (à noter que les rangs de bordures de planches peuvent dépasser les 400 g).

Attention pas de tolérance au mildiou.

IR : Fol : 1, Fol : 4.

GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION

LAITUE SUCRINE



GATSBY (Gautier) Co et Ta :

Sucriner au feuillage vert foncé cloqué, pomme très serrée. Forme assez allongée. Production homogène. Présence de septoriose en fin de cycle sur feuilles extérieures. Très bonne conservation après récolte et bonne tenue au champ. **Cycle de 51 jours. Poids moyen de 446 g.**

HR : BL : 29-39EU/Nr : 0|IR : LMV : 1



PIRANA (Gautier) Co :

Sucriner plus petite et plus tardive que GATSBI et d'un vert un peu plus clair. Production hétérogène et récolte étalée. Présence de septoriose en fin de cycle sur feuilles extérieures. Bonne conservation après récolte et tenue au champ. **Cycle de 56 jours. Poids moyen de 306 g.**

HR : BL : 32EU/Nr : 0|IR : LMV : 1



GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION

MELON CHARENTAIS SOUS ABRIS (*Cucumis melo* L., CUCURBITACEE)

Les tolérances à l'oïdium (Px) doivent être un critère de choix de la variété pour la culture du melon sous abris en AB.



IDEO F1 (Clause) NT, Ho : Fruit très rond de couleur beige. La robe est très écrite avec des sillons vert clair bien marqués. La couleur de la chair est orange. HR : Fom : 0,1,2; IR : Gc / Px : 1,2,3,3-5,5 / Ag



MAKEBA F1 (Vitalis EZ), La, Ta et Te : Melon beige à jaune, une robe très écrite de forme ronde. Les sillons sont vert clair moyennement marqués. La chair est orange foncé. HR : Fom : 0,1,2; IR : Px : 1,2,5 / Ag.



STELLIO F1 (Clause) NT, Ho : Fruit rond à la robe jaune écrite, moyennement côtelé, doté de sillons vert clair peu marqués. La couleur de la chair est orange foncé. HR : Fom : 0,1,2; IR : Gc / Px : 1,2,5 / Ag.



TONGA F1 (Gautier) Co, La et Ta : Fruit très écrit d'une couleur beige à jaune. La forme est ronde à légèrement ovale, le fruit est très peu côtelé. Les sillons sont de taille moyenne et vert foncé. Chair orange. HR : Fom : 0,1,2; IR : Gc : 1 / Px : 1,2,5, 3-5 / Ag.

OIGNON (*Allium cepa* L., LILIACEE)



A gauche la Veronique,
à droite la Rose Bourbon.

15 à 30 t/ha en fonction de l'altitude et de la variété.

KASKAVEL (ROSE BOURBON) NT, Fl : forme arrondie, tendance au gros calibre, conservation moyenne, bonne tolérance à la bactériose, potentiel de production plus important.

VERONIQUE NT, Fl : forme aplatie, très bonne conservation, sensible à la bactériose.

GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE
POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNIONTOMATE INDETERMINEE SOUS ABRIS (*Solanum lycopersicum* L., SOLANACEE)

TOMATE RONDE

Pour une densité de plantation de 2 plts/m², le rendement espéré est de 10 à 15 kg/m². Les variétés conseillées ci-dessous sont toutes des hybrides car le choix a été fait en fonction des tolérances au TYLC (virus transmis par le puceron et largement présent à La Réunion). Toutes les variétés présentent des fruits homogènes d'un calibre compris entre 67 et 82 mm.



FIORENTINO F1 (Vitalis EZ), La, Ta et Te : fruits de belle présentation avec des lobes bien dessinés, 180 g en moyenne. Bonne conservation. HR: ToMV. Va.Vd. Fol: 0-2 - IR : TYLC. Ma. Mi. Mj



BRENTYLA F1 (Gautier), Co : précoce au niveau de la floraison. Fruit de 170 g en moyenne. HR: ToMV. Va.Vd. Fol: 0-1 , TSWV - IR : TYLC. Ma. Mi. Mj

GROSSE TOMATE

Attention pas de travaux réalisés sur les grosses tomates, la variété ci-dessous avait été évaluée dans l'essai tomate type « ronde » mais non retenu pour cette catégorie car trop grosse. D'autres variétés de grosses tomates sont disponibles chez les fournisseurs.



BAPTYSTA HF1 (Gautier) NT, Co : fruit d'un poids moyen de 200 g, production au mètre carré plus faible que les variétés précédentes mais reste satisfaisante pour sa catégorie. Tendance aux fentes de croissance et floraison tardive.

TOMATE ALLONGEE

MYRIADE F1 (Gautier) Co, La et Ta : fruits ovoïdes de très belle présentation. Plant vigoureux et bouquets fournis grâce à une excellente nouaison. Variété très productive, fruits très homogènes et bonne conservation après récolte. Cependant attention pas de tolérance au TYLC.

HR: ToMV 0, Va(0), Vd(0), Fol 0, 1, For, Pf : 1-5 IR: Ma, Mi, Mj



AGRO F1 : la tomate allongée type San Marzano. Variété productive, calibre homogène et bonne conservation après récolte. Qualité gustative à noter. Pas de tolérance au TYLC.

HR: ToMV 0, Va(0), Vd(0), Fol 0 IR: Ma, Mi, Mj



TOMATE DE DIVERSIFICATION

NOIRE DE CRIMEE (Domaine public) Ho, La et Ta : tomate ronde légèrement aplatie, belle présentation, rouge foncé avec des striures vert foncé. Fruit charnu, très bonne qualité gustative. Bonne production, calibre hétérogène. Son plus : le prix de la semence.



PORTE-GREFFE TOMATE

En absence de flétrissement bactérien (*Ralstonia solanacearum*) : **SUPERPRO F1 (Vilmorin) NT, Ho**

En présence de flétrissement bactérien : **ANCHOR F1 et SHIELD F1 (Rijk zwaan) NT, Co**



GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE
POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION**POMME DE TERRE** (*Solanum tuberosum* L., SOLANACEE) (hors dérogation)

Attention les plants doivent être commandés en octobre-novembre pour une réception février-mars de l'année suivante. Rendement de 15 à 25 t/ha en fonction de l'altitude et de la variété. Les variétés suivantes fonctionnent aussi bien dans les bas que dans les hauts. Cependant préférez les variétés tolérantes au mildiou pour les hauts ou dans des conditions de production humides.



JEANNETTE (Station recherche comité nord), **Te :**

Peau rose pâle, chair jaune. Forme oblongue allongée à allongée. Calibre moyen (40-55 mm). Moyennement sensible au mildiou. **Cycle de 95 à 98 j.** **Cuisson : salade, vapeur**



MONALISA (F.G. VAN DER ZEE et de Z.P.C.), **Te :**

Peau jaune, chair jaune. Forme oblongue courte à oblongue. Calibre moyen (40-55 mm). Moyennement sensible au mildiou. Sensible à la gale commune. **Cycle de 95 à 98 j.** **Cuisson : polyvalente.**



VITABELLA (Stet Holland BV), **Te :**

Peau jaune, chair jaune. Forme oblongue courte à oblongue. Calibre moyen (40-55 mm). Bonne tolérance au mildiou. **Sensible à la gale commune. Cycle de 102 à 104 j.** **Cuisson : frite, salade, vapeur.**



YONA (Germicopa), **Ho :**

Peau rose pâle, chair jaune clair. Forme oblongue à oblongue allongée. Calibre moyen (40-55 mm). Tolérante au mildiou. **Cycle de 90 à 96 j.** **Cuisson : frite.**



CORNE DE GATTE (type ratte), **Te :**

Production faible mais intéressante pour de la diversification. Peau : orange-rose pâle, chair jaune clair. Forme très allongée. Calibre inférieur à 35 mm. Mildiou : peu sensible. **Cycle de 90 à 96 j.** **Cuisson : salade, vapeur.**

GUIDE DES VARIÉTÉS POTAGÈRES ET DE POMME DE TERRE
POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION

LES CONTACTS

COROI

17 Rue Armagnac - 97420 Le Port
(pas de magasin, vente uniquement sur commande)
s.commercial@coroi.fr
06 92 60 83 32

**FLHORYS**

1 chemin de l'IRFA - 97410 St-Pierre,
0692 69 88 54 ou - 06 92 91 20 42

**HORTIBEL**

33 avenue Charles Isautier - 97410 St-Pierre
02 62 35 45 46

**L'AGRONOME (INTERAGRO OI)**

St-Benoit/ St-Pierre/ Plaine des cafres
Commercial.interagro@groupegmdsas.com
0262597626

**TALARMOR AGRI**

2 rue Pierre Kichenapanaïdou
ZA Vadivel Vayaboury - 97410 St-Pierre
02 62 43 38 87 - talagri@orange.fr

**TERRACOOP**

Zone Est : lucas.hoarau@gammagri.fr / 0693 97 37 75

Zone sud : laurent.metro@gammagri.fr /
0692 69 08 95

Zone nord /nord et Est :

pascal.grondin@terracoop.re / 0692 68 30 59

Zone sud/sud-est : emmanuel.hoareau@terracoop.re /
0692 60 46 42



LES PÉPINIÉRISTES EN AB

DAVID BONNETETE

97432 Ravine des Cabris
0692 68 58 01

HORTI PEI

St-Gilles les Hauts
jean.vidal@hortipei.com - 0692 04 87 72

**LA PEPINIERE BY GMD**

3 rue des Violettes, ZA Bras Fusil,
97470 St-Benoît
lapepinierabygmd@gmail.com - 02 62 92 40 21

**SCEA MULTIPLANTES**

Tampon / St-Pierre / St-Joseph
0262278412 - multiplantesscea@gmail.com

ABRÉVIATIONS DES RÉSISTANCES :

IR : Résistance Intermédiaire ; HR : Haute Résistance

BROCOLIS, CHOU...

Ac : champignon rouille blanche (*Albugo candida*)

Foc : champignon fusariose vasculaire (*Fusarium oxysporum* f. sp. *Conglutinans*)

Pb : champignon hernie des crucifères (*Plasmodiophora brassicae*)

Xcc : bactérie nervation noire des crucifères (*Xanthomonas campestris* pv. *Campestris*)

CONCOMBRE, COURGETTE, MELON

Ag : puceron du cotonnier (*Aphis gossypii*)

Cca : champignon cercosporiose (*Corynespora cassicola*)

Ccu : champignon cladosporiose (*Cladosporium cucumerinum*)

CGMMV : virus de le marbrure du concombre (*Cucumber Green Mottle Mosaic Virus*)

CMV : virus mosaïque du concombre (*Cucumber Mosaic Virus*)

Fom : champignon fusariose vasculaire (*Fusarium oxysporum* f.sp. *Melonis*)

Gc : champignon oïdium (*Golovinomyces cichoracearum* (ex *Erysiphe cichoracearum*))

PRSV : virus des taches en anneaux du papayer (*Papaya RingSpot Virus*)

Px : champignon oïdium (*Podosphaeria xanthii* (ex *Sphaerotheca fuliginea*))

WMV : virus de la mosaïque de la pastèque (*Watermelon Mosaic Virus*)

ZYMV : virus de la mosaïque jaune de la courgette (*Zucchini Yellow Mosaic Virus*)

HARICOT

BCMV : virus de la mosaïque commune du haricot (*Bean Common Mosaic potyvirus*)

Cl : champignon Anthracnose (*Colletotrichum lindemuthianum*)

LAITUE

Bl : Champignon Mildiou de la laitue (*Bremia lactucae*)

Fol : Champignon Fusariose vasculaire (*Fusarium oxysporum*.sp. *Lactucae*)

LMV : virus de la mosaïque de la laitue (*Lettuce Mosaic Virus*)

Nr : puceron de la laitue (*Nasonovia ribisnigri*)

TOMATE TOMV. VA.VD. FOL: 0-2 - IR :

TYLC. MA. MI. MJ
Fol : champignon fusariose vasculaire de la tomate (*Fusarium oxysporum* f. sp. *Lycopersici* [race 0,1,2;3])

Ma : nématode à galles (*Meloidogyne arenaria*)

Mi : nématode à galles (*Meloidogyne incognita*)

Mj : nématode à galles (*Meloidogyne javanica*)

ToMV : virus de la mosaïque de la tomate (*Tomato Mosaic Virus*)

TYLCV : Virus Maladie des feuilles jaunes en cuillère de la tomate (*Tomato yellow leaf curl virus*)

Va : champignon verticilliose (*Verticillium albo-atrum*)

Vd : champignon verticilliose (*Verticillium dahliae*)

Gaëlle TISSERAND

gaelle.tisserand@armeflhor.fr

Fiche technique ARMEFLHOR, 2024



ARMEFLHOR - Institut technique horticole de l'Océan Indien

1 chemin de l'Irfa - Bassin Martin - 97410 SAINT-PIERRE

0262962260 | www.armeflhor.fr

